



Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta s výkonom očkovania podľa § 6 zákona č. 576/2004 Z. z.

Meno:	Priezvisko:	Rodné číslo:
Bydlisko:		
Telefónne číslo (prípadne e-mail):		
Meno zákonného zástupcu:	Dátum a čas očkovania:	

Aktuálne ťažkosti, novovzniknuté ťažkosti, prípadne prejavy ochorenia a iné anamnestické údaje pacienta:

.....
.....

Anamnestické otázky pre pacienta:

Otázka	Áno	Nie
Máte príznaky akútneho ochorenia (teplota nad 37°C, produktívny kašeľ, kašeľ s vykašliavaním hlienu, slabosť, bolesti kĺbov a svalov, malátnosť, infekčnú hnačku, bolesti hrdla)		
Beriete, alebo brali ste za posledný týždeň antibiotiká?		
Trpíte závažným ochorením, ktoré bolo v minulosti posudzované ako možná prekážka (kontraindikácia) pre podanie vakcíny (napr. autoimunitné ochorenie, demyelinizačné ochorenie) ?		
Mali ste závažnú alergickú reakciu v minulosti (napr. anafylaktický šok) ?		
Mali ste niekedy v minulosti závažné vedľajšie príhody po podaní vakcíny?		
Máte vážnu poruchu zrážanlivosti krvi (napr. vážna forma hemofílie) ?		
Ste tehotná ?		
Aké lieky užívate:		

Podpis očkovanej/ očkovaného:

Dátum:

Navrhovaný (plánovaný) výkon prevencie:

COMIRNATY Pfizer BioNTech je očkovačacia látka (vakcína). Podanie očkovačej látky je možné označiť za predstavenie vírusu imunitnému systému pacienta s vyvolaním tvorby protilátok a zapojením ďalších mechanizmov chrániacich následne pred vznikom ochorenia. Podanie očkovačej látky je pri dvojdávkovej očkovačej schéme v dvoch dávkach, pri jednodávkovej očkovačej schéme v jednej dávke. Očkovačacia látka (vakcína) môže byť bielkovina vírusu, oslabený vírus vyvolávajúci krátkodobú tvorbu bielkoviny vírusu, mRNA – nejadrová RNA kódujúcu bielkovinu vírusu. Podanie očkovačej látky je možné označiť za predstavenie vírusu imunitnému systému pacienta s vyvolaním tvorby protilátok a zapojením ďalších mechanizmov chrániacich následne pred vznikom ochorenia. Dodatočná tretia dávka pre imunokompromitované osoby je súčasťou základnej očkovačej schémy a vykonáva sa mRNA vakcínami. Posilňovaciu („booster“) dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre ostatné osoby je možné podať v prípade dvojdávkovej očkovačej schémy najskôr po 3 mesiacoch po podaní základnej očkovačej schémy a v prípade jednodávkovej očkovačej schémy najskôr po 8 týždňoch od podania základnej očkovačej schémy.

Ja, dolu podpísaný/á pacient/ka potvrdzujem svojím podpisom, že som bol/a informovaný/á o povahe navrhovaného diagnostického výkonu prevencie, ktorý absolvujem za účelom prevencie, ako aj o jeho možných následkoch a rizikách (nežiaduce účinky aplikovanej vakcíny sú zverejnené v tzv. Písomnej informácii pre používateľa, ktorú je možné nájsť na stránke www.sukl.sk a v priestoroch očkovačieho pracoviska Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o.).

Bol/a som tiež poučený o možnostiach voľby navrhovaných výkonov a o rizikách ich odmietnutia. Poučenie mi bolo poskytnuté zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť. Poučeniu som porozumel/a.

Taktiež potvrdzujem, že som bol/a informovaná o možných kontraindikáciách v súvislosti s podaním vakcíny, ktorými sú precitlivosť na niektorú zložku vakcíny alebo akútne horúčkové ochorenie. Bližšie informácie o očkovačej látke môžete nájsť v tzv. Písomnej informácii pre používateľa, ktorú je možné nájsť na stránke www.sukl.sk a v priestoroch očkovačieho pracoviska Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o.

Ako každý liek aj táto vakcína môže mať niektoré sprievodné účinky, ktoré väčšinou trvajú 1-2 dni. Po prvej dávke je ich množstvo a intenzita vyššia ako po druhej dávke vakcíny. Medzi najčastejšie sprievodné účinky patrí:

- Bolesť a začervenanie v mieste vpichu
- Pocit únavy a bolesť svalov a kĺbov bolesť hlavy
- Nevoľnosť
- Zvýšená telesná teplota alebo horúčka
- Príznaky podobné chrípke

Po očkovaní si vyhradte čas (1-2 dni) tak, aby ste mali nenáročný program, aktívne necvičte, zdržte sa náročnej fyzickej práce, abstinujte, oddychujte. Sprievodné účinky očkovania tak budú miernejšie a postupne odoznejú. V prípade výskytu sprievodných účinkov:

- Na miesto vpichu si prikladajte studené obklady.
- Pri teplote oddychujte a v prípade horúčky užite lieky na zníženie teploty podľa dávkovania v príbalovom letáku (paracetamol, ibuprofen, acylpyrín). Dávkovanie neprekračujte. Pite viac tekutín

Svojím podpisom potvrdzujem, že s navrhovaným výkonom prevencie SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM. (nehodiace sa preškrtnúť). Tento súhlas dávam pri plnom vedomí, slobodne a vážne.

Pokiaľ by vyššie uvedené navrhované preventívne výkony nebolo z kapacitných dôvodov možné vykonať v Nemocnici s poliklinikou Brezno, n.o. bezodkladne, vyhlasujem, že napriek možnosti podstúpiť vyššie uvedené výkony v iných zdravotníckych zariadeniach, na vykonaní predmetného výkonu v Nemocnici s poliklinikou Brezno, n.o. trvám a som pripravený vyčkať až do termínu, na ktorý som objednaný.

Hlásenie akéhokoľvek podozrenia na nežiaduce účinky môžete vykonať aj priamo na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv cez elektronický formulár na www.sukl.sk, alebo telefonicky na 02/507 01 206.

V Brezne, dňa, čas

.....
podpis a odtlačok pečiatky lekára

.....
podpis pacienta (prípadne zákonného zástupcu pacienta, ak ho pacient má)